



SMINKTETOVÁLÁS TÁJÉKOZTATÓ TUDNIVALÓK A PERMANENT MAKE UP ELJÁRÁSRÓL

A sminktetoválás során speciális sminktetováló pigmenteket jutattunk a bőrbe (a hám és az írha réteg határához) sminktetováló készülékkel. A sminktetoválás eredménye tartós, általában 2-4 évig tart, a szín fokozatosan halványodik el, teljes eltüntetésre csak lézeres kezeléssel van lehetőség. A mikropigmentálás tartósságát években pontosan meghatározni nem lehet, egyéntől, kortól, bőrtípustól, illetve a külső hatásoktól függően eltérő.

Az eljárás egyénenként változó fájdalomérzettel jár.

A festékmegmaradás mértékét és a végleges színárnyalatot a bőr egyéni adottságai jelentősen befolyásolják, ezért előre pontosan nem lehet garantálni a végeredményt. Színváltozás előfordulhat különböző kémiai (pl. bőrfehérités, gyümölcssavas hámlasztás...) és környezeti hatás következtében (UV sugárzás a tetoválást követő 7-10 napon belül), illetve néhány belgyógyászati betegség következményeként.

Szájnál a betetovált festéknek átlagosan 50%-a, szemnél és szemhéjnél 30%-a kiesik a varral együtt. A képződő var átlagosan 4-6 nap elteltével esik le. A pigmentálás után keletkezett pörköt TILOS vakargatni, piszkálni, gyógyulás folyamán magától fog leesni. Véglegesítésre a tetoválást követő 30. és 90. nap között kerülhet sor. A sminktetoválást követően egyéni érzékenységtől függően felléphet extra immunreakció, melyek közül az eddigi esetekben az alábbiak fordultak elő: herpesz szájtetoválás esetén (gyakori azoknál, akik hajlamosak a herpeszre, de kialakulhat azoknál is, akiknek még soha nem volt herpeszük), hőemelkedés vagy láz (ritkán), allergiás bőrreakció (nagyon ritkán).

KIZÁRÓ OKOK

Terhesség

Menstruáció

Szülés után 3 hónapig, illetve szoptatási idő alatt

Bármely krónikus betegség esetén csak írásos szakorvosi engedéllyel (vesebetegség, májbetegség, cukorbetegség, daganatos betegség....)

Bármilyen vírusos vagy bakteriális fertőzés (influenza, hepatitis B, AIDS, TBC...)

Megfázás és lázas állapot Lézeres szemöldök eltávolítás után csak két hónappal

Herpesz esetén

Sugárkezelés alatt vagy azt követő 1,5 éven belül

Bármilyen rendszeresen szedett gyógyszer esetén csak orvosi

engedéllyel

Penicillin tartalmú gyógyszer szedése (vérzékenyebbé tesz)

csökkenti a festék megmaradást

Véralvadást gátló gyógyszer szedése Véraláfutás vagy duzzanat az adott területen

Rozácea terület, anyajegy, véranyajegy, tűzfolt, egyéb bőrelváltozások

Ciszta vagy bármely folyadékkal telt hólyag helyén Gyulladás bőrfelület, akne, ekcéma helyén

Cserepes száj (csak szájtetoválásnál)

Nagyon ráncos bőr

3D műszempilla esetén szemhéjtetoválás nem végezhető

ELŐTTE NEM SZABAD

Tartós szempilla vagy szemöldökfestés 2-3 napon belül Fehéritő kozmetikai kezelés előtte 3 hónapig

Gyümölcssavas hámlasztás előtte 3 hónapig Szemöldök gyanta előtte 1 hétig

Koffein tartalmú ital fogyasztása a tetoválás napján

Alkohol fogyasztása előtte 1 napig

Nyugtató hatású szerek – gyógynövényes készítmények szedése a tetoválás napján, (elernyed az izom)

Bármilyen anfetamin származék használata Fájdalomcsillapító hatású szerek - gyógynövényes készítmények szedése tetoválás előtt 1 nappal

Antibiotikum szedése tetoválás előtt min.1 hétig

UTÁNA NEM SZABAD

Napozni és szoláriumozni minimum 20-25 napig (UV elváltoztatja a festék színét)

Erős verejtékezéssel járó sport 4-5 napig

Uzsoda, szauna 20-25 napig (fertőzés veszély)

Leszedni a kiszáradt sebes bőrt

Zsíros vagy savas krémek használata

Szemöldökborotválás szemöldök tetoválás esetén

Szemöldök tetoválás esetén a területet sem eljárás előtt, sem utána leborotválni nem szabad!

OTTHONI ÁPOLÁS

Szükség esetén tiszta kézzel vizes alapú hidratáló, illetve gyulladáscsökkentő, sebgyógyulást elősegítő krémmel.